



衛生署疾病管制局

H7N9流感 (民眾版)

衛生署疾病管制局

2013年4月17日



簡報大綱

- 疫情源起
- 中國大陸疫情現況
- H7N9流感簡介
- 台灣因應作為
- 台灣通報檢驗現況
- H7N9 流感Q & A
- 專線及疫情更新網站



疫情源起

- 中國大陸自2013年3月31日起陸續公佈人類感染**H7N9**流感病毒確定病例，病例臨床表現多為早期出現發燒、咳嗽及呼吸短促等呼吸道感染症狀，而後發展為嚴重肺炎甚至死亡。



中國大陸疫情現況 (2013.4.17上午更新)

- 自3/31起至今公佈共77例人類感染H7N9禽流感病毒病例，其中16例已死亡。
- 此77例確診病例中，有數例曾與禽鳥接觸或宰殺活禽。上海市傳出可能的家庭群聚，亦經回溯性確診5例病例；北京市公布1例經由主動篩檢發現的H7N9禽流感病毒無症狀帶原者。
- 疫情發生初期確認的病例臨床表現多為早期出現發燒、咳嗽等呼吸道感染症狀，而後發展為嚴重肺炎和呼吸困難等重症表徵；近期確認的病例陸續出現輕症個案，亦發現無症狀之病毒帶原者。
- 依現有流行病學調查結果，推測感染來源可能為禽類，現階段無證據顯示有持續性人傳人現象。

(查詢最新疫情)

4



- 中國大陸H7N9流感病例發生地區有：上海市、安徽省、江蘇省、浙江省、北京市、河南省。

(查詢最新疫情)

中國大陸H7N9流感病例分布



2013.4.17上午更新
5



衛生署疾病管制局

H7N9流感簡介

6



名詞釋疑

- 季節性流感 (Seasonal influenza)
 - 在人類每年發生季節性流行的流感
 - 有效人傳人，有疫苗可供預防
- 禽流感 (Avian influenza)
 - 主要在禽類間流行的流感，分為高病原性與低病原性
 - 偶然感染人類，主要為禽傳人，H5N1可能具備有限性人傳人的能力
 - 病例多在於禽類疫情發生處，且多有禽鳥接觸史
- 豬流感(Swine influenza)
 - 主要在豬隻間流行的流感
 - 通常很少經由人與人傳播，但2009年H1N1新型流感經過基因重組後，造成大流行
- 大流行流感(Pandemic influenza)
 - 如演化出新型流感病毒，人類無免疫力，且可人傳人，導致全球發生大流行，此疾病稱為「大流行流感」



何謂禽流感

- 禽流感是禽鳥類的疾病，引起禽流感的流感病毒與人類的流感病毒很相似，但不容易感染人類
- 禽流感病毒感染可見於野生水鳥間，卻不常引起鳥兒生病或只有輕微症狀
- 部份禽流感病毒感染了家禽後，會造成大量家禽死亡，這類的病毒株我們將它稱為高病原性禽流感病毒



為何擔心人類被禽流感病毒感染

- 過去已知僅有少數的禽流感病毒(如H5N1)曾造成人類的感染，具有有限性人傳人的能力，故人類病例多在於禽類疫情發生處，且多有禽鳥接觸史
- 禽流感病毒也可能在感染人類後，進一步演變成容易在人跟人之間傳播、且引起嚴重疾病的病毒，如此就容易造成大流行
- 但目前尚未觀察到，禽流感病毒演化成有效的人傳人



人類感染禽流感病毒的途徑

■ 感染來源

- 感染病毒的禽鳥
- 病毒污染的環境

■ 傳染方式

- 禽傳人：接觸染病禽鳥或其排遺汙染的環境
- 有限人傳人：無適當防護下與發病期病例極密切接觸者，目前案例大多具有親緣關係



衛生署疾病管制局

H7N9流感致病原

- H7N9流感病毒(H7N9 Influenza virus)



H7N9流感傳染窩

- 目前陸續於人類H7N9病例出現地區的禽鳥檢測到H7N9流感病毒，且依據病毒基因序列分析結果顯示人類感染的病毒應屬禽源性
- 該病毒於動物流行病學(含主要宿主、地理散播等)，尚雖不明確，但多數人類感染病例與動物接觸史有關

(資訊更新連結)

12



H7N9流感傳染途徑

- 一般來說，禽流感病毒會存在於受感染禽鳥的呼吸道飛沫顆粒及排泄物中，人類主要是透過吸入及接觸病毒顆粒或受病毒汙染的物體與環境等途徑而感染。至於H7N9 流感病毒的傳染途徑，則正在調查中。



H7N9流感潛伏期及可傳染期

■ 潛伏期

- H5N1流感的潛伏期通常約為2~8天，H7N9流感的潛伏期仍在調查中

■ 可傳染期

- 根據目前的觀察似乎不會有效人傳人，但目前尚無證據顯示H7N9 流感的可傳染期為何(此部分資訊需待觀察疫情演變及後續研究)



H7N9流感臨床症狀

- 根據中國大陸所報告的H7N9流感案例，最初病徵包括高燒、咳嗽及呼吸急促等症狀
- 有些患者病情會在一週內，進展為下呼吸道疾病，造成呼吸困難、肺炎，並在之後的一兩天內，快速進展成需要重症加護的照顧，甚至造成死亡
- 死亡個案的病程從發病到死亡約2-3週



台灣因應作為

- 2013年4月3日起將H7N9流感列為第五類法定傳染病
- 提升防疫應變等級，加強疫情監測，提升機場港口檢疫措施
- 醫界提高警覺與加強醫院感染管制
- 公費流感抗病毒藥劑擴大對象，並延長至2013年4月30日止
- 持續加強媒體溝通及宣導，提醒民眾避免接觸鳥禽並做好個人防護措施





台灣通報檢驗現況

■ 國內監測

- 國內目前無H7N9確定病例
- 國內自今年4月3日起將「H7N9流感」列為第五類傳染病，迄今累計共85例通報病例，其中5例檢驗中，餘均已排除H7N9感染。
(2013.4.17上午更新)

(查詢最新疫情)

17



衛生署疾病管制局

如何預防H7N9流感(Q &A)?

18



個人之預防方法

- 養成良好個人衛生習慣、注意飲食均衡、適當運動及休息，維護身體健康
- 用肥皂勤洗手，不亂摸口鼻及眼睛
- 肉品及蛋類必須完全煮熟再食用
- 料理生鮮禽畜肉品及蛋類後立即洗手，刀具、砧板也要徹底清洗後才能再度使用
- 不要購買或飼養來源不明或走私的禽鳥
- 避免接觸禽鳥及其分泌物，若不慎接觸，應馬上以肥皂徹底清潔雙手
- 非必要或無防護下，避免到生禽宰殺處所及養禽場



個人如何避免感染 H7N9流感



勿碰觸禽鳥及其屍體



禽肉及蛋類要熟食



勤洗手，注意衛生習慣



個人健康指引



打噴嚏，手帕肩袖掩口鼻



生病戴上口罩
儘速就醫



生病即就醫
在家休息





Q: 到有H7N9流感個案的地區旅遊時之注意事項

- 掌握前往地區的疫情概況
- 注意個人衛生，養成勤洗手的習慣
- 避免到活禽市場、屠宰場或養禽場參觀，也要避免餵食鳥類
- 不接觸禽鳥及其排泄物，萬一不小心接觸到，必須馬上用肥皂徹底洗淨雙手
- 千萬不要攜帶禽鳥返台
- 返國時如出現類流感症狀，可於機場尋求檢疫人員協助，返家後如有不適，應戴上口罩儘速就醫，並向醫師說明旅遊史及接觸史





Q: 自中國大陸返台，於下飛機(船)時有發燒、身體不適的情形，該如何處理？

- (38度°C以上)、咳嗽、發病前7日內曾至中國大陸H7N9流感病例發生地區
- 請主動告知機場(港口)檢疫站
- 檢疫人員將協助後送至醫院就醫，進行診療



Q: 家裡養寵物禽鳥的人要怎麼辦？

- 家中飼養禽鳥需避免與野鳥接觸或共用食器
- 定期清洗、消毒養禽設備及其排泄物，清消時應戴口罩
- 避免直接接觸家禽、鳥類或其糞便。接觸過家禽、鳥類或其分泌物後，要立刻用肥皂和清水徹底洗淨雙手
- 自家飼養的禽鳥死亡時，請密封包裝後，以一般廢棄物處理，由垃圾車清運；如有疾病疑慮，可洽所在地動物防疫機關處理
- 接觸禽畜後10天內，如出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等類流感症狀或結膜炎，請戴口罩就醫，並主動告知禽鳥接觸史



Q:於家中要如何照顧可能感染 H7N9 流感的家人_(1/2)？

■ 個案如何保護旁人

- 勤洗手
- 注意咳嗽禮節與呼吸道衛生
- 避免外出
- 在家戶內公共區域時，也應配戴外科口罩
- 外出就醫時，在可以忍受的情況下，應戴上外科口罩

■ 家人如何幫助個案

- 個案居住於單獨、通風良好的房間、單獨使用一間浴廁；房間中準備必要的生活物品、足量外科口罩及必備藥品
- 外務儘量由家人代辦
- 倘發生嚴重症狀或併發症，請主動與衛生單位聯繫，以利安排儘速就醫治療



Q:於家中要如何照顧可能感染 H7N9 流感的家人_(2/2) ?

■ 家人如何減低感染風險

- 儘量由同一成員照料病患
- 非主要照料者，避免進入個案房間
- 進出個案房間隨手關門
- 接觸過患者或患者曾接觸過之物品後皆應洗手
- 與個案面對面時，可配戴口罩
- 家中應保持良好的通風
- 家中可適當消毒
- 個案之同住者應隨時注意自身健康狀況，如有不適可主動與衛生單位聯繫，以利其安排儘速就醫



Q: 禽畜相關從業人員如何保護？

- 工作中應勤洗手並避免碰觸口鼻
- 工作時應注意自我防護措施
- 不到疫區國家的養禽場參觀訪問，也不要邀請疫區國家之養禽業者到國內
- 如果出現類流感症狀，應配戴口罩盡速就醫，並主動告知醫師自己的職業與禽鳥接觸史
- 配合動物防疫機關，進行必要的採樣監測工作
- 接種季節性流感疫苗以降低人類與禽類病毒於人體進行基因重組的風險





衛生署疾病管制局

民眾疫情通報及關懷專線

- 簡碼：1922
- 防疫專線：0800-001922



最近疫情資料

- 每日更新國內外最新疫情於疾病管制局網站 www.cdc.gov.tw
- H7N9專區>查閱最新疫情